

ALOPURINOL 20 MG/ML SUSPENSIÓN

Código: pn/I/fm/018/00

Fecha última modificación: 17/08/2007

Redactado por:

María Aranda Alcántara

Revisado por:

Rosa Romero Jiménez

Aprobado por:

Esteban Valverde

Forma farmacéutica: suspensión

Cantidad preparada: 100 ml

Contenido unitario: 100 ml

Nº de envases resultantes: 1

Conservación: Frasco topacio. Nevera.

Caducidad: 60 días

Características del producto acabado: suspensión

Material: mortero, vaso de precipitado, frasco color topacio

Método específico (modus operandi):

Mezclar el jarabe simple y la solución de metilcelulosa en un mortero, agitando suavemente. Esperar unas 3 horas antes de usarlo. Triturar los comprimidos en un mortero hasta obtener un polvo fino y pasarlo por un tamiz del nº 2. Añadir un poco del vehículo preparado y formar una pasta. Pasarlo a un vaso de precipitado e ir arrastrando lo que queda en el mortero con el vehículo hasta enrasar a 100 ml. Colocar en el agitador durante unos 5 minutos.

Línea	Producto	Cantidad	Unidades
1	alopurinol 100 mg comp	20	comp
2	metilcelulosa 1%	50	ml
3	jarabe simple	50	ml

Controles de calidad:

Verificar características organolépticas del producto acabado

Indicación:

Antigotoso, inhibidor de la xantino-oxidasa

Bibliografía: Atienza Fernández M, Martínez Atienza J, Marín Gil R. Formulación en Farmacia Pediátrica. 3ª ed. 2005.