

DAPSONA 5 MG/ML SUSPENSIÓN

Código: pn/I/fm/531/00

Fecha última modificación: 27/08/2007

Redactado por:

Ana Luna Higuera
Miriam Toca Muñoz

Revisado por:

Ana Luna Higuera
Miriam Toca Muñoz

Aprobado por:

Carmen Gallego Fdez

Forma farmacéutica: suspensión

Cantidad preparada: 100 ml

Contenido unitario: 100 ml

Nº de envases resultantes: 1

Conservación: frasco topacio plástico. Nevera.

Caducidad: 90 días

Material: mortero, tamiz, vaso de precipitado, agitador, frasco topacio plástico.

Método específico (modus operandi):

Triturar los comprimidos de Sulfona® 100 mg y tamizar el polvo. En un mortero añadir poco a poco el agua agitando hasta formar una pasta espesa, pasar a un vaso de precipitado y continuar añadiendo agua sin dejar de agitar. Añadir un poco de jarabe y agitar. Añadir la solución de ácido cítrico al 25% (pH 4-5). Enrasar con jarabe simple hasta 100 ml. Agitar hasta completa homogeneización. Envasar seguidamente en frasco topacio de plástico.

Línea	Producto	Cantidad	Unidades
1	dapsona (sulfona®) 100 mg	5	comp
2	agua conservans	30	ml
3	ác. Cítrico 25%	5	gotas
4	jarabe simple c.s.p	100	ml

Controles de calidad:

Verificar características organolépticas del producto acabado

Indicación:

Dermatitis herpetiforme. Tratamiento de lepra. Tratamiento de neumonía por *Pneumocystis carinii*.

Observaciones:

Puede conservarse también a Tª ambiente, por encima de 25°C, de este modo, en algunas ocasiones la suspensión toma un color ligeramente amarillento, sin embargo no cambia de olor ni de sabor.

Bibliografía: Atienza Fernández M, Martínez Atienza J, Marín Gil R. Formulación en Farmacia Pediátrica. 3ª ed. 2005.