

# NITROGLICERINA 0,2 % POMADA

**Código:** pn/I/fm/068/00

**Fecha última modificación:** 29/05/2008

**Redactado por:**

Betsabé Cáliz Hernández  
Virginia Henares López

**Revisado por:**

Betsabé Cáliz Hernández  
Virginia Henares López

**Aprobado por:**

Carmen Gallego Fernández

**Forma farmacéutica:** pomada.

**Cantidad preparada:** 30 g

**Contenido unitario:** 30 g

**Nº de envases resultantes:** 1

**Conservación:** Proteger de la luz.

**Caducidad:** 30 días

**Características del producto acabado:** pomada

**Material:** mortero, pistilo.

**Método específico (modus operandi):**

Pesar la cantidad de nitroglicerina y vaselina. Añadir la nitroglicerina en un mortero e ir añadiendo la vaselina por dilución geométrica. Si la cantidad a preparar es grande se puede humectar la nitroglicerina con vaselina líquida.

Línea	Producto		Cantidad	Unidades
1	nitroglicerina		3	g
2	vaselina filante	c.s.p.	30	g

**Controles de calidad:**

Verificar características organolépticas del producto acabado.

**Indicación:**

Tratamiento de las fisuras anales crónicas.

**Observaciones:**

Al igual que con otras formas farmacéuticas de nitratos no se debe administrar junto con sildenafil puesto que potencia los efectos hipotensores.

**Bibliografía:** Formulario SEFH