

---

## DESMOPRESINA solución para neonatos

### COMPOSICIÓN

Desmopresina acetato c.s.p.  
Suero salino fisiológico c.s.p.

#### Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

#### Caducidad

5-7 días

#### Administración

Intranasal

### MODUS OPERANDI

- 1.- La solución deberá prepararse en las mejores condiciones de asepsia posibles para evitar la contaminación con lo que se facilita y prolonga la estabilidad.
- 2.- El disolvente será suero salino fisiológico estéril, este disolvente es adecuado siempre que la dilución de desmopresina esté entre un rango de 1:2 y 1:10.

### INDICACIONES

Diabetes insípida.

### OBSERVACIONES

Deberá envasarse en vial estéril, de cristal o en jeringas de administración oral de 1 ml, con lo que se evita la posible contaminación entre una dosis y otra.  
La estabilidad de este polipéptido depende bastante de su esterilidad, pues es susceptible de favorecer el crecimiento de bacterias.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001
- 2.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 3.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123 , 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **DESMOPRESINA solución para neonatos**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- *Diabetes insípida y enuresis nocturna.*

#### **CONSERVACIÓN**

- *Refrigerado. No congelar. Proteger de la luz directa.*

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *La demeclociclina, la glibenclamida, el litio y la epinefrina pueden disminuir sus efectos antidiuréticos. Clofibrato, clorpropamida, carbamazepina y esteroides pueden aumentarlos.*
- *Puede que sea necesario limitar la ingesta de líquidos durante el tratamiento.*

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Debe despejar correctamente las fosas nasales antes de cada administración. Espere entre 3 y 5 minutos antes de limpiar nuevamente la nariz si tiene que volver a aplicar el fármaco.*
- *Si olvida administrar una dosis hágalo tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a desmopresina*

#### **PRECAUCIONES**

- *En hipertensión arterial o intracraneal, infecciones respiratorias superiores, congestión nasal (puede disminuir la absorción del medicamento).*
- *No existe evidencia clínica sobre la seguridad del uso de la desmopresina en embarazo o lactancia.*

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- *Cefalea, náuseas, retención de líquidos (si no se controla la ingesta de líquidos durante el tratamiento) y calambres.*

#### **RECOMENDACIONES**

- *Consulte a su médico si presenta cefalea intensa y prolongada o si aparece hinchazón en las piernas como consecuencia de la retención hídrica.*