

---

## ETOPÓSIDO suspensión 10 mg/ml

### COMPOSICIÓN

Etopósido.....100 mg  
Cloruro sódico al 0,9 % c.s.p..... 5 ml

#### Conservación

Tª ambiente, protegido de la luz

#### Caducidad

22 días

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

Trabajar con las precauciones especiales que se exigen para los citostáticos.

- 1.- Extraer el contenido del vial (Ver observaciones).
- 2.- Verterlo en el vaso de precipitado.
- 3.- Añadir la solución de fisiológico.
- 4.- Mezclar bien.
- 5.- Envasar en jeringas topacio de 5 ml para administración oral.  
Puede prepararse también más directamente:  
Cargando las jeringas previamente con 2,5 ml de solución salina y completando hasta 5 ml con la solución de Vepesid®.

### INDICACIONES

Antineoplásico, derivado podofilotoxínico semisintético.

### OBSERVACIONES

Hasta la fecha, el etopósido como materia prima, no es posible adquirirlo en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad:

Vepesid®vial 100 mg/5 ml

Se administra diluido en zumo de naranja, manzana o limonada, con esta última la solución es estable al menos 3 horas .

En el etiquetado deberá figurar el lote, la caducidad y la recomendación de "agitar.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press Massachusetts.1999; 532.
- 2.- McLeod HL, Relling MV. Stability of etoposide solution for oral use. Am J Hosp. Pharm 49: 278-5. 1992.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol. 123, 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **ETOPÓSIDO suspensión 10 mg/ml**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- *Antineoplásico del grupo de las epipodofilotoxinas.*

#### **CONSERVACIÓN**

- *A temperatura ambiente y protegido de la luz.*  
- *Los sobrantes deben ser devueltos al servicio de Farmacia para su correcta eliminación.*

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *No tome aspirina o cualquier medicamento que contenga aspirina sin consultar a su médico.*

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Administrar preferentemente con el estómago vacío, aunque la cantidad de fármaco absorbida no interfiere con los alimentos.*  
- *Se administra con zumo de naranja, manzana o limonada.*  
- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*  
- *Si olvida tomar alguna dosis consulte a su médico.*

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a etopósido.*

#### **PRECAUCIONES**

- *Se recomienda el uso de anticonceptivos en edad fértil, durante el tratamiento. Los efectos adversos sobre el feto pueden proceder de la madre o del padre. En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la administración del medicamento.*  
- *Sus efectos inmunosupresores aumentan la probabilidad de infecciones.*

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- *Alopecia, náuseas/vómitos, pérdida de apetito, infecciones y alteraciones sanguíneas (anemia, leucopenia o trombocitopenia).*

#### **RECOMENDACIONES**

- *Evite en lo posible el contacto con personas infectadas.*  
- *Consulte a su médico si aparecen síntomas de infección (fiebre o escalofríos), dificultad respiratoria, dolor de garganta o hemorragias.*  
- *Lávese los dientes con cepillos suaves, el medicamento puede provocar inflamación o irritación de la mucosa bucal.*  
- *Se recomienda realizar periódicamente recuentos de leucocitos y plaquetas.*