

---

## FLUCITOSINA suspensión 10 mg/ml

### COMPOSICIÓN

Flucitosina.....1 g  
Agua destilada c.s.p.....100 ml

#### Conservación

Refrigerado. Protegido de la luz

#### Caducidad

2 meses

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar los comprimidos hasta polvo fino.
- 2.- Tamizar el polvo por tamiz de 0,25 mm y verterlo en el vaso de precipitado, aforado a 100 ml.
- 3.- Añadir una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta espesa.
- 4.- Incorporar el resto del agua con agitación de forma geométrica hasta obtener una suspensión homogénea, enrasar y homogeneizar.
- 5.- Envasar sin dejar reposar, llenando los frascos topacio hasta poco más de la mitad.

### INDICACIONES

Antifúngico para tratamiento de infecciones sistémicas.

### OBSERVACIONES

Hasta la fecha, la flucitosina como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Ancotil® 500 mg comp.

En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", además del lote, caducidad, conservación en frigorífico y protección de la luz.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Revisión de nuevas fórmulas pediátricas orales. Nájera Pérez MD, y col. XL Congreso de la SEFH. Granada 1998.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **FLUCITOSINA suspensión 10 mg/ml INFORMACIÓN AL PACIENTE**

### **INDICACIONES**

- *Antifúngico utilizado para el tratamiento de infecciones sistémicas por hongos como Candida, Cryptococcus y Aspergillus.*

### **CONSERVACIÓN**

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *Indique a su médico si está en tratamiento con citarabina.*

### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*  
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a flucitosina.*

### **PRECAUCIONES**

- *Puede provocar reacciones de fotosensibilidad.*  
- *Puede provocar molestias digestivas.*  
- *Insuficiencia renal, hepática o alteraciones sanguíneas.*  
- *Consulte a su médico si está embarazada o en lactancia.*

### **EFFECTOS ADVERSOS**

- *Alteraciones gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas o somnolencia.*

### **RECOMENDACIONES**

- *Los pacientes con insuficiencia renal requieren ajuste de dosis.*  
- *No es recomendable una exposición prolongada al sol. Utilice cremas fotoprotectoras.*  
- *Complete el tratamiento prescrito aunque mejoren los síntomas. Si abandona el tratamiento prematuramente la infección puede reaparecer.*