

---

## GEL ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA

### COMPOSICIÓN

Lidocaína.hidrocloruro.....	1 g
Excipientes:	
Carmelosa sódica.....	2 g
Glicerol.....	10 g
Agua purificada..... c.s.p.....	100 ml

#### Conservación

T° < 30°C, protegido de la luz

#### Caducidad

3 meses

#### Administración

Aplicación local

### MODUS OPERANDI

- 1.- Disolver la lidocaína en el agua y se calienta en baño de agua (50-70°C).
- 2.- Se hace una pasta homogénea con la carmelosa sódica y la glicerina.
- 3.- Se añade la pasta sobre la disolución de lidocaína, en caliente, agitando hasta que alcance la temperatura ambiente.
- 4.- Se envasa en tubos de plástico.

### INDICACIONES Y POSOLOGÍA

Anestésico local para alivio sintomático del prurito y dolor asociado a quemaduras leves, picaduras y hemorroides. También se utiliza para exploraciones de boca, laringe, nariz y tracto urinario.

**REACCIONES ADVERSAS, PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES, INTERACCIONES, POSOLOGÍA** así como los **COMENTARIOS Y OBSERVACIONES** que incluye el Formulario Nacional en esta parte, se citan en el prospecto de **INFORMACIÓN AL PACIENTE**, por lo que los omitimos aquí, para evitar la repetición de los mismos dentro del mismo procedimiento.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Formulario Nacional. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid

## GEL ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA

Forma farmacéutica: gel

*Vía de administración:* uso cutáneo, este medicamento debe aplicarse sobre la piel.

### COMPOSICIÓN (100 g)

Lidocaína, hidrocloreuro	1 g
Gel de carmelosa c.s.p.	100 g

**ACTIVIDAD- INDICACIONES:** Anestésico local utilizado para calmar el picor y dolor producido por heridas, quemaduras, eczemas y hemorroides. Se utiliza en exploraciones de boca, laringe, nariz y tracto urinario.

**CONTRAINDICACIONES:** esta contraindicado en pacientes alérgicos a anestésicos locales tipo amida.

**PRECAUCIONES:** No se debe aplicar sobre mucosas, ojos, ni zonas inflamadas o infectadas de la piel,

Si se ha aplicado en la boca o la faringe no se debe comer ni beber hasta que pase el efecto( por lo menos media hora) para evitar atragantarse o morderse la lengua.

El tratamiento de áreas extensas de la piel aumenta la absorción sistémica, por lo que el médico debe controlar este tratamiento, en especial, en pacientes con epilepsia, problemas cardíacos, hepáticos, porfiria o cuando se trate de niños o ancianos.

**INTERACCIONES:** si está en tratamiento con algún medicamento, especialmente para la hipertensión o para problemas cardíacos consulte a su médico o farmacéutico antes de usar el gel.

### ADVERTENCIAS:

*Embarazo y lactancia:* no debe utilizarse durante el embarazo y lactancia sin consultar al médico.

*Uso en niños:* el tratamiento debe ser supervisado por el médico

*Efectos sobre la capacidad de conducción:* hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

*Otras:* contiene una sustancia susceptible de producir resultado positivo en un control de dopaje.

### POSOLOGÍA:

*Adultos:* se debe aplicar sobre la zona 3-4 veces al día.

*Ancianos y niños:* el médico deberá establecer la posología

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:** Si se ha aplicado en la boca o la faringe no se debe comer ni beber hasta que se pase el efecto (por lo menos media hora), para evitar atragantarse o morderse la lengua.

**INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIS:** En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Tfno: 91 5620420.

**REACCIONES ADVERSAS:** Ocasionalmente reacciones alérgicas como urticaria, inflamación, dermatitis de contacto y reacciones anafilácticas. Se han descrito casos de metahemoglobinemia, a pesar de ser de aplicación tópica y existir baja absorción.

**CONSERVACIÓN:** Este medicamento debe conservarse a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.

**CADUCIDAD:** No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.