
INDOMETACINA suspensión 2 mg/ml

COMPOSICIÓN

Indometacina.....200 mg
Alcohol de 70 ° c.s.p
Jarabe simple c.s.p.....100 ml

Conservación

Refrigerado, no congelar,
protegido de la luz

Caducidad

3 meses

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar la cantidad correspondiente de polvo, teniendo en cuenta la riqueza del mismo.
- 2.- Verterlo a un vaso de precipitado.
- 3.- Humedecer el polvo con unas gotas de alcohol de 70°, agitar bien.
- 4.- Añadir parte del jarabe simple poco a poco y agitando bien.
- 5.- Ajustar el pH a 5,2 aproximadamente.
- 6.- Completar con la totalidad del jarabe simple
- 7.- Agitar durante 5 minutos a 2000 r.p.m.
- 8.- Envasar seguidamente, en frascos topacio, llenándolos solo hasta poco más de la mitad.

INDICACIONES

Antiinflamatorio no esteroideo. Cierre del ductus arteriosus.

OBSERVACIONES

La estabilidad que indicamos, está basada en la bibliografía encontrada para formulaciones similares elaboradas a partir de la especialidad farmacéutica. En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", conservar en frigorífico, protegido de la luz, el lote, la caducidad y que contiene sacarosa (0,8 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Gupta UD, Gibbs CW y col. Stability of pediatric liquid dosage forms of ethacrynic acid, indometacin, methyl dopate hydrochloride, prednisolone and spironolactone. Am J Pharm, 35: 1382-1385, 1978
- 2.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts.1999; 45.
- 3.- The Hospital Sick Children, Department of Pharmacy, Toronto, 2000.
- 4.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 5.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 6.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

INDOMETACINA suspensión 2 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Antiinflamatorio, analgésico y antipirético de tipo no esteroideo.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado, procurando que no se congele y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *No tome simultáneamente con la indometacina otros analgésicos como aspirina, naproxeno o ibuprofeno.*
- *Indique a su médico si está en tratamiento con diuréticos, anticoagulantes o digoxina.*
- *Los alimentos reducen su absorción oral; a pesar de ello se recomienda su administración conjunta para reducir los efectos adversos gastrointestinales.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*
- *Puede tomarse con alimentos, leche o antiácidos para disminuir las molestias digestivas.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a indometacina o a otros analgésicos/antiinflamatorios (aspirina, naproxeno).*

PRECAUCIONES

- *Trastornos gastrointestinales, coagulopatías o hemorragia.*
- *Asma, trastornos de la visión, insuficiencia renal o cardíaca, hipertensión, enfermedad tiroidea o insuficiencia hepática.*
- *No se recomienda su uso durante el embarazo salvo indicación explícita. Su uso se considera compatible con la lactancia materna.*
- *Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFECTOS ADVERSOS

- *Afectan fundamentalmente al sistema nervioso y gastrointestinal. Las más comunes son cefalea, mareos y alteraciones digestivas.*

RECOMENDACIONES

- *No es recomendable su asociación con otros antiinflamatorios no esteroideos, ya que es poco probable que aumente la eficacia, mientras que el riesgo de efectos adversos aumenta notablemente.*