

---

## LIDOCAÍNA en ORABASE al 1%

### COMPOSICIÓN

Lidocaína.....1 g  
Orabase c.s.p.....100 g

#### Conservación

Protegido luz

#### Caducidad

1 mes

#### Administración

Tópica oral

### MODUS OPERANDI

Pulverizar la lidocaína y añadir unas gotas de vaselina líquida.  
Incorporar poco a poco el orabase.

### INDICACIONES

Aftas bucales accesibles y aisladas.

### OBSERVACIONES

Envasar en recipiente de cristal opaco.  
Esta fórmula se asocia a veces a otros principios activos como antifúngicos (nistatina) y corticoides para tratar aftas por candida.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Reynolds JEF (ed). Martindale. The Extra Pharmacopeia. 29 ed. London Pharmaceutical Press 1989.
- 2.- C.O.F. de Vizcaya. Apuntes de formulación magistral. Bilbao 1989.
- 3.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts.1999; 1293.
- 4.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001
- 5.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 6.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.