
METRONIDAZOL suspensión 15 mg/ml

COMPOSICIÓN

Metronidazol..... 1,5 g
Jarabe simple c.s.p..... 100 ml

Conservación

Refrigerado, protegido luz

Caducidad

2 meses

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Colocar el polvo en un mortero, triturar bien el polvo.
- 2.- Incorporar jarabe simple poco a poco y sin dejar de agitar hasta conseguir una pasta fluida.
- 3.- Transvasar todo lo anterior a una probeta, arrastrando los residuos del mortero con más jarabe simple.
- 4.- Llevar hasta un volumen final de 100 ml con el jarabe.
- 5.- Agitar bien.
- 6.- Envasar en frascos topacio de 60 ml, llenándolos solo hasta poco más de la mitad.
- 7.- Etiquetar.

INDICACIONES

Antiinfeccioso nitroimidazólico, bactericida, amebicida y tricomonocida.

OBSERVACIONES

La estabilidad que indicamos, está basada en la bibliografía encontrada para formulaciones similares elaboradas a partir de la especialidad farmacéutica. En el etiquetado se deberá recomendar "agitar antes de usar", el lote, la caducidad, la conservación en frigorífico y que contiene sacarosa (0,8 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Int J Pharm Comp, vol I, nº 3, pág 200, 1997.
- 2.- The Hospital Sick Children, Department of Pharmacy, Toronto, 2000.
- 3.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 4.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 5.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

METRONIDAZOL suspensión 15 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Antiinfeccioso activo frente a bacterias y protozoos (como Entamoeba o Trichomonas).*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, disulfiram, fenitoína, fenobarbital o cimetidina.*
- *Los alimentos no modifican significativamente su absorción oral.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Es preferible administrarlo con alimentos o leche para disminuir las molestias digestivas.*
- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a metronidazol u otros nitroimidazoles.*

PRECAUCIONES

- *Insuficiencia hepática, alteraciones sanguíneas o neurológicas.*
- *Uso controvertido durante el embarazo (especialmente durante el primer trimestre).
Uso precautorio durante la lactancia materna.*
- *Durante el tratamiento la orina puede oscurecerse y adquirir un tono marrón/rojizo; es un efecto normal del tratamiento que no debe preocuparle.*
- *Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFECTOS ADVERSOS

- *Frecuentemente alteraciones digestivas: náuseas, falta de apetito, sequedad de boca o alteraciones del gusto. Más raramente puede aparecer cefalea, cistitis, incontinencia urinaria, alteraciones cutáneas o hematológicas.*

RECOMENDACIONES

- *Realizar periódicamente determinaciones de transaminasas y recuentos sanguíneos si el tratamiento es superior a 10 días.*

