

---

## PERMETRINA pomada al 5%

### COMPOSICIÓN

Permetrina.....5 g  
Base para pomada oftálmica.....100 g

#### Conservación

Temperatura ambiente

#### Caducidad

3 meses

#### Administración

Tópica

### MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar la permetrina hasta polvo fino .
- 2.- Interponer en el excipiente.
- 3.- Esterilizar en calor seco a 150 ° C durante 2 horas.

### INDICACIONES

Blefaritis por ácaros, sarna y piojos.

### OBSERVACIONES

Suele prepararse de igual modo también a la concentración del 1 %.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Torronteras. Servicio de Microbiología. Hospital Universitario "Virgen del Rocío",1998.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **PERMETRINA pomada al 5%**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- *Tratamiento de blefaritis (inflamación de los párpados) por ácaros sarna y piojos.*

#### **CONSERVACIÓN**

- *A temperatura ambiente.*

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos.*

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Esta pomada se administra exclusivamente vía tópica (uso externo).*
- *Aplicar mediante masaje cuidadoso y meticuloso, dejar actuar durante un tiempo (se le darán instrucciones), y aclarar con abundante agua y jabón.*

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a la permetrina o a los crisantemos.*

#### **PRECAUCIONES**

- *Si la pomada entra en contacto con los ojos proceder al inmediato lavado de los mismos con abundante agua.*
- *No aplicar sobre heridas ni mucosas, ni en casos de irritación persistente de la zona.*
- *En madres lactantes se debe considerar la suspensión de la lactancia materna o de la administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.*

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- *Picor, irritación o quemazón.*
- *Eritema, entumecimiento y hormigueo.*

#### **RECOMENDACIONES**

- *Si el prurito y/o la irritación persisten durante más de 2 semanas consulte a su médico*